

2018-2019절기

# 어린이 인플루엔자 예방접종 안내문

올해는 더 편하게 겨울건강 준비하세요~

다가오는 9월 11일부터 가까운 동네 병·의원에서도  
인플루엔자 예방접종이 무료 시행됩니다.



## 어린이 인플루엔자 예방접종 지원사업

- **지원대상**: 생후 6개월~12세 어린이(2006. 1. 1. ~ 2018. 8. 31. 출생아)  
※ 인플루엔자 유행기간을 고려하여 2019년 2월 28일 기준으로 생후 6개월이 되는 대상자까지 지원
- **지원내용**: 인플루엔자 접종 1회  
\* 생후 6개월 ~ 만 8세 이하 소아 중 다음 대상자는 2회 접종 지원  
- 인플루엔자 예방접종을 처음 하는 경우(또는 이전 접종력을 모르는 경우)  
- 2018. 7. 1. 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우  
· 예방접종 일정 및 접종횟수는 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.
- **무료접종기간**: 2018. 10. 2. (화) ~ 2019. 4. 30. (화)  
(단, 2회 접종 대상자는 2018. 9. 11. (화) 부터 접종시작 가능)  
✓ 인플루엔자 유행시기 시작 전인 10~11월, 학생은 방학 전에 접종을 완료하시기 바랍니다.
- **접종기관**: 지정 의료기관 및 보건소  
※ 지정 의료기관은 질병관리본부 예방접종도우미 홈페이지  
(<https://nip.cdc.go.kr>)에서 확인하시기 바랍니다.



## 인플루엔자 예방접종 효과

- 예방접종을 받은 사람의 연령, 기저질환, 이전 감염과 접종여부에 따른 면역 상태, 백신 바이러스 주와 유행바이러스의 일치정도에 따라 매년 A, B형의 효과가 19~52%로 나라별, 군주별로 다양하나, 백신주와 유행주가 일치할 경우 건강한 성인에서 70~90% 예방효과를 보입니다.



## 이런 분들은 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우

※ 인플루엔자 백신 접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요합니다.





## 예방접종 전·후 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간 이상을 주의 깊게 증상을 관찰합니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 곧 의사의 치료를 받도록 합니다.



## 인플루엔자 예방접종 후 이상반응

### [예방접종 후 발생 가능한 이상반응]

- 국소 이상반응 : 접종부위 통증, 발적
- 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

### [예방접종 후 이상반응이 생기면]

- 예방접종 부위의 통증, 부종, 발열 등과 같은 증상은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내에 호전됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.



- 예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소에 신고 또는 예방접종도우미 홈페이지 (<https://nip.cdc.go.kr>)의 '이상반응 신고하기' 에서 온라인으로 신고합니다.
- 정부는 예방접종 후 이상반응이 발생하면 예방접종과의 관련성에 대해 심의를 거쳐 확인될 경우 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있습니다.

※ 자세한 사항은 접종받은 의료기관이나 보건소에 문의 또는 예방접종도우미 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.



## 인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- 자주 손을 씻고 개인 위생수칙을 잘 지킵니다.
- 기침이나 재채기를 할 때는 손수건이나 휴지, 옷깃 등으로 입을 가리는 기침 예절을 지킵니다.
- 인플루엔자가 유행할 때에는 가급적 사람들이 많이 모이는 장소의 방문을 피합니다.
- 인플루엔자에 감염되었을 경우 집단 내 전파를 예방하기 위해 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교를 자제하도록 합니다.
- 인플루엔자 의심 증상\*이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받습니다.

\* 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통(침이나 음식 삼킬 때 목의 통증), 기침, 두통, 근육통, 전신 피로감 등의 증상을 보임

